

Arizona çeşitli toprak ve iklim koşullarında yetişebilen erkenci yemeklik bir çeşittir.

- ARIZONA sarı kabuklu ve açık sarı et renkli yemeklik bir çeşittir.
- Yumrular oval, homojen şekilli, iri ve yüzlek gözlüdür.
- Yüksek verimli düşük kuru madde oranına sahip olan ARIZONA orta dönem depolamaya uygundur.
- Yüksek sıcaklık toleransına sahip iyi virüs direnci olan güvenilir bir çeşittir.



ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yetiştirme tipi

Yemeklik

Bitki özellikleri

Olgunluk dönemi

Erkenci

İlk gelişimi

Orta derecede

Çiçek rengi

Beyaz

Yumru özellikleri

Et rengi

Açık sarı

Kabuk rengi

Sarı

Yumru Boyutu

Oval İri,

Göz Derinliği

Yüzlek

Kuru Madde Oranı

%17,2

Mekanik hasara dayanıklılığı

Hassas

Uyku Dönemi

Orta derece

Pişme Tipi

AB

Hastalıklara Dayanıklılık

Altın Kist Nematode: RO 1and 4 Dayanıkl

Altın Kist Nematode: RO 2 and 3 Duyarlı

Beyaz Kist Nematode: PA 2 Duyarlı

Beyaz Kist Nematode: PA 3 Duyarlı

Yⁿ-virus Dayanıkl

Y^{ntn}-virus Dayanıkl

Adi uyuz Orta derece dayanıkl

Tozlu uyuz Orta derece dayanıkl

Yumru yanıklığı Az hassas

Yaprak yanıklığı Hassas

Spraing Oldukça dayanıkl



Gübreleme Önerileri

Gübreleme

Azot:	Standart uygulama - 10%
Fosfor:	Standart uygulama
Potasyum:	Standart uygulama

Tohum Bakımı

Bir kereden fazla sürgün kırılmasında verim ve yumru homojenitesi üzerinde olumsuz etki vardır. İyi yumrulara sahip olmak için tepe filizlerinin kırılıp yan gözlerin filizlenmesi gereklidir. Çillenme işlemi yapıldıktan sonra 2 gün bekletildikten sonra kaplama ilaç yapılmalıdır.

"Toprak sıcaklığının min. 12 derece olmalıdır."

NOT: Patates tohumları kesinlikle kesilmemelidir.

Gübreleme seviyesi toprak analizine göre yapılmalıdır.



Yabancı Ot Önlemi

Metribuzin kullanımı ciddi bir yaprak reaksiyonu ve bazı verim azalması sağlar. Normal kullanımın %50 altında kullanılması önerilir. Çıkış öncesi Linuron kullanımı tavsiye edilir.

Mantar Uygulaması

Mildiyo'ye karşı hassas olduğu için sıkı bir koruyucu uygulama yapılması gereklidir.



Hasat ve Depolama



Hasat

Üst öldürülmesinden sonra hasata başlamak için minimum 15 gün beklenmesi gereklidir. Çünkü mekanik hasara karşı oldukça hassastır. Bu yüzden hasat hasarına dikkat edilmelidir.

Depolama

Arizona orta derece bir uyku dönemine sahiptir. 5°C de 6 ay depolanabilir.