

MARABEL yemeklik değeri yüksek, mükemmel tadı ve pişme kalitesi olan orta erkenci bir çeşittir.

- Marabel, sarı kabuklu ve açık sarı et renginde pazarlanabilir yüksek verimli bir yemeklik çeşittir.
- Kuru madde içeriği orta ve pişirme kalitesi iyidir.
- Marabel sıcak ve kuru hava şartlarında istikrarlı verim sağlayan ve kolay yetişebilen bir çeşittir.



ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yetiştirme tipi

Yemeklik

Hastalıklara Dayanıklılık

Bitki Özellikleri

Olgunluk Dönemi

Orta erkenci

İlk Gelişimi

İyi

Çiçek Rengi

Beyaz

Yumru Özellikleri

Kabuk rengi

Sarı

Et rengi

Açık Sarı

Yumru şekli

Oval - Yuvarlak

Yumru Boyutu

Oval

Göz Derinliği

Sığ

Kuru Madde Oranı

%17,2

Pişme Tipi

B

Mekanik Hasara Dayanıklılığı

Orta derece dayanıklı

Bruising

Hassas

Uyku Dönemi

Orta derece

Altın Kist Nematodu R01 R04

Dayanıklı

Adi uyuz

Orta derece dayanıklı

Spraing

Dayanıklı

Brusing

Hassas

Yaprak Yanıklığı

Dayanıklı

Y virüsü

Dayanıklı

Erwinia

Dayanıklı



Gübreleme önerileri

Gübreleme

Azot: standard uygulama + %10

Fosfor: standard uygulama +% 20

Potasyum : standard uygulama

Tohum Bakımı

Tohum filizlenmeye başladığında temizleme işlemi yapıp 2 gün bekletildikten sonra ilaçlama yapılması tavsiye edilir. **"Marabel'in dikiminde toprak sıcaklığının 12° olması verimi artırır."**

Yabancı Ot Önlemi

Çıkış öncesi Metrubuzin kullanılması tavsiye edilir

Mantar İlaçlama

Rhizoctania ve geç yanıklığa karşı dayanıklı olan Marabel yine de önleyici rutin bir ilaçlama programı ister.

NOT: Patates tohumları kesinlikle kesilmemelidir.

Gübreleme seviyesi toprak analizine dayanır.

Hasat ve Depolama

Hasat

Üst öldürme sonrası 14 gün bekletildikten sonra hasat edilmelidir. Aksi halde makina hasarları Fusarium'a sebebiyet verebilir.

Depolama

Marabel de depo nemi %85 -%90 oranında olmalı. Depoda oluşabilecek CO2 miktarına ve depo sirkülasyonuna dikkat edilmelidir. 6°C sıcaklıkta uzun bir uyku dönemine sahiptir.