



Toprağa bereketinizi ekiyoruz...

2019 / 2020

ÜRÜN KATALOĞU

İçindekiler

KURUMSAL

02

02 SERVİS ANLAYIŞIMIZ

YEMEKLİK ÇEŞİTLER

03

- 04 AGRIA
- 06 AGATA
- 08 ANUSCHKA
- 10 ARIZONA
- 12 CONCORDIA
- 14 CONSTANCE
- 16 JELLY
- 18 JULINKA
- 20 LAURA
- 22 MADELEINE
- 24 MARABEL
- 26 MARFONA
- 28 RUMBA
- 30 SANTE
- 32 VOGUE
- 34 VOLARE

CİPSLİK ve PARMAK PATATES

36

- 37 AGRIA
- 39 ARSENAL
- 41 BASIN RUSSET
- 43 FONTANE
- 45 JELLY
- 47 LAURA
- 49 MARKIES
- 51 RUMBA
- 53 OTTAWA

HASTALIKLAR

56

- 57 BAKTERİYEL SOLGUNLUK
- 58 BAKTERİYEL GÖVDE VE MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ
- 59 HALKA ÇÜRÜKLÜĞÜ
- 60 RHIZOCTONIA KANSERİ
- 62 PATATES UYUZU
- 63 SOLGUNLUK HASTALIĞI
- 64 TOZLU UYUZ
- 65 MİLDİYÖ HASTALIĞI


Servis Anlayışımız



YEMEKLIK ÇEŞİTLER

AGRIA
AGATA
ANUSCHKA
ARIZONA
CONCORDIA
CONSTANCE
JELLY
JULINKA
LAURA

MADELEINE
MARABEL
MARFONA
RUMBA
SANTE
VOGUE
VOLARE





Agria®

Özellikleri:

- AGRIA yüksek kuru madde içeriği ve uzun oval yumru şekliyle parmak patates ve cips sanayi için çok uygun bir çeşittir.
- AGRIA uzun süreli depolamada kalitesini koruyan bir çeşittir.
- AGRIA yüksek verimli çeşit olduğundan daha az azota ihtiyacı vardır.
- 10-11 kg/da azot dozu aşılmamalıdır. Dengeli potasyum, fosfor ve magnezyum gereklidir.



Kızartmalık



Yemeklik



Fırında



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Parmak patates, cips ve yemeklik
Yumru Et Rengi:	Koyu sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı ve pürüzsüz
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksek

Yumru Özelliği:	Orta ebatta uniform yapılı
Göz Derinliği:	Yüzeysel
Yumru Boyutu:	Uzun oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi
Çiçeklenme Aralığı:	Oldukça sık

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y-A ve yaprak kıvrıcıklığı Virüsüne karşı orta derece dayanıklıdır.
Mantar Hastalıklar Mukavemeti:	Rhizoctania ya karşı yüksek derece dayanıklılığa sahiptir.

Bakteriyel Hastalıklar Mukavemeti:	Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
------------------------------------	-------------------------------------

Dormansi Süreci

Uzun süre depolama özelliğine sahip depolama kalitesi oldukça iyi bir çeşittir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,
- Yemeklik için 25-28 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,





Agata®

Özellikleri:

- AGATA düzgün ve yıkanabilir kabuk özelliğine sahip yüksek verimli yemeklik bir çeşittir.
- AGATA yumrular oval, homojen büyüklükte ve yüzlek gözlere sahiptir. Bu özellikle perakende paketlemeye uygundur.
- AGATA pişme tipi sert, kalitesi yüksek, kuru madde oranı düşüktür.
- Yumru sayısı çoktur.
- Toprak yapısı bakımından seçicidir.



Yemeklik



Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Perakende paketlemeye uygun oldukça lezzetli yemeklik bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Orta ebatta uniform yapılı
Yumru Et Rengi:	Sarı	Göz Derinliği:	Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı ve pürüzsüz	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Düşüktür	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Erkenci	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Az	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y ve yaprak kıvrıcılığı Virüsüne karşı orta derece dayanıklıdır.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Dormansi Süreci

Erkenci bir çeşit olan AGATA uzun süre depolamaya uygundur. 3-4°C sıcaklıkta kutu kasalarda uzun süre saklanabilir ve kalitesini korur.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 19-21 cm,
- Yemeklik için 26-28 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,
- Su stresi yaşatılmamalı,



Anuschka®

Özellikleri:

- ANUSCHKA pazarlanabilir yüksek verimli sarı kabuk renkli açık sarı et rengine sahip sanayide ve yemeklik piyasasına uygun bir çeşittir.
- ANUSCHKA düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
- ANUSCHKA Yumrular uzun oval yumru sayısı ve verimi yüksektir.
- ANUSCHKA erken paketlemeye uygun bir çeşittir.
- ANUSCHKA iyi tarım koşullarında ve topraklarında yetiştirilmelidir.



Yemeklik



Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı
Kuru Madde Oranı:	Orta derece

Yumru Özelliği:	Uzun oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Erkenci
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Yn-virüsüne dayanımı orta yüksektir. Tütün halka virüsüne (Spraing) dayanımı düşüktür. Altın Kist nematodu RO1 ve RO4 ırkına dayanıklıdır. Yaprak kıvrıkcık virüsüne dayanımı yüksektir.
----------------------------------	--

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuya dayanımı orta yüksektir.
Mantar Hastalıklarına Mukavemeti:	Geç yanıklığa (mildiyö) yeşil aksamın dayanımı yüksektir. Rhizoctonia'ya dayanımı orta yüksektir.

Dormansi Süreci

Yüksek depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- İyi topraklarda yetiştirilmesi tercih edilir.
- Dikim derinliği normali lokal standartlarla karşılaştırılmalıdır.
- Dikim mesafesi bitki yoğunluğuna bağlı olarak 35/55mm bitki yoğunluğuna,3.800bitki/dA şeklinde olmalıdır.
- Dikimden önce 3-4gün içerisinde; filizlenme teşvik edilmesi tavsiye edilir.
- Rutin bir şekilde Mildiyöye karşı ilaçlama yapılması tavsiye edilir.
- Gübreleme ise azot normal seviyede,fosfor dikimde 10kg/dA suda eriyebilen formda ve potasyum dekara 20/25kg ve magnezyum 6kg miktarlarda verilmesi tavsiye edilir.



Özellikleri:

- ARIZONA sarı kabuklu ve açık sarı et renkli yemeklik bir çeşittir.
- Yumrular oval, homojen şekilli, iri ve yüzlek gözlüdür.
- Yüksek sıcaklık toleransına sahip iyi virüs direnci olan güvenilir bir çeşittir.



Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	İri boy
Yumru Et Rengi:	Açık sarı	Göz Derinliği:	Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Düşüktür	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta erkenci	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derece	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Bakteriyel hastalıklar Mukavemeti:	Adi uyuza karşı hassastır. Erwinia karşı orta dayanıklıdır.	Mantar Hastalıklar Mukavemeti:	Tozlu uyuza karşı hassastır.
------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------

Dormansi Süreci

Erkenci bir çeşit olan ARIZONA oldukça iyi bir uyku sürecine sahip olup 5°C 'de uzun süre saklanabilir ve kalitesini korur.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-21 cm,
- Yemeklik için 26-30 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Concordia®

Özellikleri:

- CONCORDIA orta erkenci yüksek kalite yemeklik bir çeşittir.
- CONCORDIA yüksek verimli kaliteli depolama özelliğine sahip, yıkama ve ön paketleme için oldukça uygun bir çeşittir.



Yemeklik



Paketlemeye
Uygun

Concordia

Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Orta boy uniform yumrular
Yumru Et Rengi:	Sarı	Göz Derinliği:	Oldukça yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı ve pürüzsüz	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Orta derece	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Oldukça sık	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	X,Y ve yaprak kıvrıklığı Virüsüne karşı dayanıklıdır.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia karşı orta derecede dayanıklıdır. Adı uyuza karşı hassastır.
----------------------------------	---	-------------------------------------	--

Dormansi Süreci

Orta Erkenci bir çeşit olan CONCORDIA oldukça iyi bir uyku sürecine sahip olup uzun süre saklanabilir ve kalitesini korur.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,
- Yemeklik için 25-28 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara dikkat edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Constance

Özellikleri:

- CONSTANCE orta erkenci ana ürün yüksek kalitede oldukça popüler bir yemeklik çeşittir.
- CONSTANCE yüksek verimli kaliteli depolama özelliğine sahip, yıkama ve ön paketleme için oldukça uygun bir çeşittir.
- CONSTANCE çoğu toprak türünde yetişebilir. Virüslere karşı dirençlidir.
- CONSTANCE fırında kızartma için uygundur.



**Paketlemeye
Uygun**



Yemeklik



Fırında

Constance

Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Orta boy oval yumrular
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı	Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı ve pürüzsüz	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Orta derece	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta erkenci	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Sık	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık


Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y Virüsüne karşı dayanıklıdır.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia karşı orta derece dayanıklıdır. Adı uyuza orta derece dayanıklıdır.
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

Dormansi Süreci

Orta Erkenci bir çeşit olan CONSTANCE orta derece depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 12-20 cm,
- Yemeklik için 26-28 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara dikkat edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Özellikleri:

- JELLY pazarlanabilir yüksek verimli ve sanayilik için uygun bir çeşittir.
- JELLY depo dayanıklılığı oldukça yüksek orta geç bir çeşittir.
- JELLY orta büyüklükte yumrulara sahip olan aynı zamanda yemeklik kalitesi de oldukça yüksek bir çeşittir.



Kızartmalık



Yemeklik



Fırında



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik ve parmak patates için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı ve pürüzsüz
Kuru Madde Oranı:	Orta derece

Yumru Özelliği:	Orta ve iri boy oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Uzun oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi
Çiçeklenme Aralığı:	Sık

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y virüsüne karşı yüksek dayanıklılığına sahiptir.
Mantar Hastalıklarına Mukavemeti:	Yaprak yanıklığı ve rhizoctonia dayanımı oldukça yüksektir.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuya oldukça yüksek dayanıklılığa sahiptir.
-------------------------------------	--

Dormansi Süreci

Orta geççi bir çeşit olan JELLY uzun dönem depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,
- Yemeklik için 28-30 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara dikkat edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,
- Dikimden önce gözlerin patlamış olması çıkışı hızlandırır,





Julinka®

Özellikleri:

- JULINKA oval yumru şekli ile pazarlanabilir yüksek verimli özellikle yemeklik için uygun bir çeşittir.
- JULINKA yumrularının boyut ve şekli bakımından oldukça düzenli yapıdadır. Bu özellikle perakende paketlemeye uygundur.
- JULINKA yüksek kaliteli ve verimli bir çeşittir.
- Geç yanıklık hastalığına karşı JULINKA hassasiyet göstermesinden dolayı, düzenli bir biçimde koruyucu ilaçlama tavsiye edilmektedir.



Yemeklik



Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı ve pürüzsüz
Kuru Madde Oranı:	Oldukça Yüksek

Yumru Özelliği:	Oval şekilli uniform yapılı
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Oval
Verimlilik:	Yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Erkenci
Çiçeklenme Aralığı:	Sık

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Tütün halka virüsüne (Spraining) dayanımı düşüktür.
Mantar Hastalıkları Mukavemeti:	Karantina hastalığı olan siğil (kanser) hastalığının Ro1 ve Ro4 ırkına karşı dayanımı oldukça yüksektir.


Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza dayanımı yüksektir.
-------------------------------------	-------------------------------

Dormansi Süreci

Erkenci bir çeşit olan JULINKA, depolama kalitesi oldukça iyi bir çeşittir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,
- Yemeklik için 25-28 cm olmalı ,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Özellikleri:

- LAURA Kırmızı kabuk renginde orta geççi kaliteli depolama özelliğine sahip yemeklik aynı zamanda sanayilik olarak da kullanılabilecek oldukça lezzetli bir ürün çeşididir.
- LAURA tüm iklim tiplerine mükemmel derecede uyum sağlar.



Kızartmalık



Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli parmak patates ve yemeklik için uygundur.
Yumru Et Rengi:	Sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Kırmızı ve pürüzsüz
Kuru Madde Oranı:	Orta derece

Yumru Özelliği:	Orta ve iri boy oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	İri ve uniform yumrular
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi
Çiçeklenme Aralığı:	Oldukça sık

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Yaprak kıvrıcıklığı virüsüne dayanıklılığı yüksek, Y virüsüne karşı dayanıklılığı çok yüksektir.
----------------------------------	--

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
-------------------------------------	-------------------------------------

Dormansi Süreci

Orta geççi bir çeşit olan LAURA yüksek depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 19-21 cm,
- Yemeklik için 28-30 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara karşı direnci yüksek,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,





Madeleine®

Özellikleri:

- MADELEINE açık sarı kabuk ve sarı et renkli yemeklik bir çeşittir.
- MADELEINE yumrular uzun oval, yüzlek gözlü ve homojen boyutludur. Yumru sayısı ve verimi yüksektir.
- MADELEINE pişme tipi sert, kuru madde oranı düşüktür.
- MADELEINE Taze yemeklik tüketimi ve paketlemeye uygun bir çeşittir.
- MADELEINE tüm toprak yapılarında yetişebilir ve tüm iklim tiplerine mükemmel derecede uyum sağlar.
- MADELEINE patates uyuz hastalığına hassastır.



Yemeklik



Paketlemeye
Uygun



Madeleine®

Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı
Kuru Madde Oranı:	Düşüktür

Yumru Özelliği:	Orta boy oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta erkenci
Çiçeklenme Aralığı:	Sık

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y Virüsüne karşı dayanıklıdır.
Mantar Hastalıkları Mukavemeti:	Tozlu Uyuza Karşı Dayanıklısıdır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia ya karşı orta derece dayanıklıdır. Adi uyuza karşı hassastır.
-------------------------------------	---

Dormansi Süreci

Orta erkenci bir çeşit olan MADELEINE 5°C 'de uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 12-20 cm,
- Yemeklik için 26-28 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara dikkat edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Özellikleri:

- MARABEL yemeklik değeri yüksek, mükemmel tadı ve pişme kalitesi olan orta erkenci bir çeşittir.
- MARABEL makineli hasada ve ön paketlemeye oldukça elverişlidir.



Yemeklik



Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı
Kuru Madde Oranı:	Düşüktür

Yumru Özelliği:	Orta boy oval yuvarlak yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta erkenci
Çiçeklenme Aralığı:	Sık

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y Virüsüne karşı yüksek iken yaprak yanıklığına orta derece dayanıklıdır.
Mantar Hastalıkları Mukavemeti:	Rhizoctania ve yaprak yanıklığına karşı yüksek derece dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia yüksek derece dayanıklıdır. Adi uyuya orta derece dayanıklıdır.
-------------------------------------	---

Dormansi Süreci

Orta erkenci bir çeşit olan MARABEL iyi derecede depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-22 cm,
- Yemeklik için 28-32 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara dikkat edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Marfona®

Özellikleri:

- MARFONA parlak kabuklu ve açık sarı et renkli taze yemeklik bir çeşittir.
- MARFONA yumru sayısı az, yumru boyutları homojendir.
- MARFONA Yumrular iri, yuvarlak oval şekildedir.
- MARFONA Kuru madde oranı orta olup pişme kalitesi serttir.



Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Kısa boy oval yumrular
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı	Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Orta derece	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta erkenci	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y Virüsüne karşı ve yaprak kıvrıcıklığı virüsüne karşı hassastır.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia orta derece dayanıklıdır. Adi uyuya orta derece dayanıklıdır.
Mantar Hastalıkları Mukavemeti:	Tozlu uyuya karşı orta derece dayanıklıdır.		

Dormansi Süreci

Orta erkenci bir çeşit olan MARFONA iyi derecede depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,
- Yemeklik için 28-30 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara dikkat edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,
- Susuzluğa direnci yüksek,



Rumba®

Özellikleri:

- RUMBA pazarlanabilir yüksek verimli hem sanayide, hemde yemeklikte kullanılan bir çeşittir.
- RUMBA düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
- RUMBA kuru madde oranı oldukça yüksek olup cipslik sanayide kullanılabilir.
- RUMBA kurak iklime uyum sağlar dayanıklıdır.



Kızartmalık



Yemeklik



Cipslik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli sanayilik ve yemeklik için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksektir

Yumru Özelliği:	Kısa boy oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Patates Y virüsüne ve yaprak kıvrıcıklığı virüsüne karşı yüksek dayanıklıdır.
Mantar Hastalıklarına Mukavemeti:	Yaprak yanıklığına yüksek dayanıklıdır.


Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
-------------------------------------	-------------------------------------

Dormansi Süreci

Orta geççi bir çeşit olan RUMBA uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,





Sante

Özellikleri:

- SANTE sarı kabuk ve açık sarı et renkli taze yemeklik patates çeşididir.
- SANTE ön paketlemeye oldukça elverişlidir.
- SANTE orta derece kuru madde oranına sahip olup oldukça verimlidir.



Yemeklik



Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Kısa boy oval yumrular
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı	Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Orta derece	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta erkenci	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık


Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y Virüsüne karşı orta derece dayanıklıdır. Yaprak kıvrıcıklığı virüsüne karşı yüksek derece dayanıklıdır.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia hassastır. Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
Mantar Hastalıkları Mukavemeti:	Tozlu Uyuza Karşı yüksek derece dayanıklıdır.		

Dormansi Süreci

Orta erkenci bir çeşit olan SANTE orta derece depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Vogue

Özellikleri:

- VOGUE parlak sarı kabuk ve krem et rengiyle taze yemeklik bir patates çeşididir.
- VOGUE Yumrular oval, muntazam şekilli, iri ve sık gözlüdür.
- VOGUE Yumru sayısı orta, homojen verimi yüksektir.
- VOGUE pazarlanabilir yüksek verime sahiptir.



Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı
Kuru Madde Oranı:	Düşüktür

Yumru Özelliği:	İri boy oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta erkenci
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Yn-virüsüne dayanımı oldukça yüksektir. Tütün halka virüsüne(Spraing) dayanımı düşüktür. Altın Kist Nematoduna, RO1 ve RO4 ırkına dayanıklıdır.
Mantar Hastalıklara Mukavemeti:	Geç yanıklığa (Mildiyö) yumruların dayanımı yüksekken yeşil aksamın dayanımı orta seviyededir.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia'ya orta seviyede hassastır. Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
-------------------------------------	---

Dormansi Süreci

Uygun saklama koşullarında orta derece saklama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalıdır,



Volare

Özellikleri:

- VOLARE parlak sarı kabuk ve krem et rengiyle taze yemeklik bir patates çeşididir.
- VOLARE Yumrular yuvarlak oval, muntazam şekilli, iri ve sığ gözlüdür.
- VOLARE Yumru sayısı orta, homojen verimi yüksektir.
- VOLARE Pişme tipi oldukça sert, kuru madde oranı düşüktür.



Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik için uygun bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Kısa boy oval yumrular
Yumru Et Rengi:	Krem	Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Kabuk Rengi:	Parlak sarı	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Düşüktür	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi	Çiçek Rengi:	Mor
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y Virüsüne karşı orta derece dayanıklıdır.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia orta derece dayanıklıdır. Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
Mantar Hastalıkları Mukavemeti:	Tozlu uyuza karşı hassastır.		

Dormansi Süreci


Orta geççi bir çeşit olan VOLARE düşük derece depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

CİPSLİK ve PARMAK PATATES

AGRIA
ARSENAL
BASIN RUSSET
FONTANE
JELLY
LAURA
MARKIES
RUMBA
OTTAWA



CİPSLİK ve PARMAK PATATES



Agria®

Özellikleri:

- AGRIA yüksek kuru madde içeriği ve uzun oval yumru şekliyle parmak patates ve cips sanayi için çok uygun bir çeşittir.
- AGRIA uzun süreli depolamada kalitesini koruyan bir çeşittir.
- AGRIA yüksek verimli çeşit olduğundan daha az azota ihtiyacı vardır.
- 10-11 kg/da azot dozu aşılmamalıdır. Dengeli potasyum, fosfor ve magnezyum gereklidir.



Kızartmalık



Yemeklik



Cipslik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Parmak patates, cips ve yemeklik
Yumru Et Rengi:	Koyu sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı ve pürüzsüz
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksek

Yumru Özelliği:	Orta ebatta uniform yapılı
Göz Derinliği:	Yüzeysel
Yumru Boyutu:	Uzun oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi
Çiçeklenme Aralığı:	Oldukça sık

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y-A ve yaprak kıvrıcıklığı Virüsüne karşı orta derece dayanıklıdır.
Mantar Hastalıklar Mukavemeti:	Rhizoctania ya karşı yüksek derece dayanıklılığa sahiptir.


Bakteriyel Hastalıklar Mukavemeti:	Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
------------------------------------	-------------------------------------

Dormansi Süreci

Uzun süre depolama özelliğine sahip depolama kalitesi oldukça iyi bir çeşittir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,
- Yemeklik için 25-28 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Özellikleri:

- ARSENAL patates tohumu, sarı kabuk ve açık sarı et rengine sahip cipslik bir çeşittir.
- ARSENAL yumrular yuvarlak oval, orta boy ve yüzlek gözlüdür.
- Yumru boyutları homojen ve verimi yüksektir.
- Kuru madde oranı ve cips kalitesi oldukça yüksektir. Pişme tipi unlu, pişme kalitesi yüksektir.



Cipslik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı :	Taze sanayilik, cipslik olarak tüketilebilir.	Yemeklik Tipi:	B-C
Et Rengi:	Açık sarı	Verimliliği:	Oldukça yüksektir
Yumru Özelliği:	Orta boy oval	Göz Derinliği:	Yüzeysel
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksek	Kabuk Rengi:	Sarı

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Oldukça sık	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Yn-Virüsü: Az Hassas Yntn-Virüsü: Az hassas	Bakteriyel Hastalıklar Mukavemeti:	Adi Uyuz: Çok hassas
Mantar Hastalıklar Mukavemeti:	Tozlu Uyuz : Az Hassas Patates Mildiyösü: Hassas		

Dormansi Süreci

Arsenal patates tohumu, iyi bir uyku sürecine sahiptir ve 8 °C' de 6 ay kadar saklanabilir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,
- Yemeklik için 25-28 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Basin Russet

Özellikleri:

- BASIN RUSSET pazarlanabilir yüksek verimli sanayide ve özelliklede parmak patates de kullanılan bir çeşittir.
- BASIN RUSSET düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
- BASIN RUSSET kuru madde oranı yüksektir. Parmak patates tüketimine ve paketlemeye uygun bir çeşittir.
- BASIN RUSSET sarı kabuk açık sarı et renklidir. Yumrular uzun oval yumru sayısı ve verimi yüksektir.



Kızartmalık



**Paketlemeye
Uygun**



2019
TESCİLLİ

Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli sanayilik ve parmak patates için uygun bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Uzun oval yumrular
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı	Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksektir	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi	Çiçek Rengi:	Mavi menekşe
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Altın Kist Nematodu, RO1 ve 4 ırkına hassasken, RO2 ve 3 ırklarına kısmen dayanıklıdır. Beyaz nematod'a (Pallida) PA2 ve PA3 ırkına dayanıklıdır. Yn-virüsüne oldukça dayanıklı iken Yntn-virüsüne biraz hassastır. Tütün halka virüsüne (Spraing) oldukça hassastır.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza oldukça hassastır.
Mantar Hastalıklara Mukavemeti:			Tozlu uyuza oldukça dayanıklıdır. Geç yanıklığa(Mildiyö) -yumrular ve yeşil aksam oldukça hassastır.

Dormansi Süreci

Orta geççi bir çeşit olan BASIN RUSSET orta derece depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Özellikleri:

- FONTANE pazarlanabilir yüksek verimli sarı kabuk renkli açık sarı et rengine sahip parmak patatese ve cipse uygun bir çeşittir.
- FONTANE düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
- FONTANE kuru madde oranı yüksek ve tüm toprak yapılarında yetiştirme özelliğine sahiptir.
- FONTANE Yumrular uzun oval yumru sayısı ve verimi yüksektir.



Kızartmalık



Cipslik



2019
TESCİLLİ

Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli parmak patates için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksektir

Yumru Özelliği:	Uzun oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti:	Geç yanıklığa (mildiyö) yumrular orta seviyede dayanıklı iken yeşil aksam hassastır. Fusarium kuru çürüklüğüne oldukça dayanıklıdır.
-----------------------------------	--

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuya orta seviyede dayanıklıdır.
-------------------------------------	---------------------------------------


Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Virüs hastalıklarına dayanıklıdır. Yn-virüsüne biraz hassasken Yntn virüsüne oldukça dayanıklıdır. Virüs X'e son derece dayanıklıdır. Tütün halka virüsüne (Spraing) oldukça dayanıklıdır. Altın kist nematodu, RO1 Ve RO4 ırkına dayanıklıdır. Beyaz nematod'a (Pallida) hassastır.
----------------------------------	--

Dormansi Süreci

FONTANE 7°C 'de uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Özellikleri:

- JELLY pazarlanabilir yüksek verimli ve sanayilik için uygun bir çeşittir.
- JELLY depo dayanıklılığı oldukça yüksek orta geç bir çeşittir.
- JELLY orta büyüklükte yumrulara sahip olan aynı zamanda yemeklik kalitesi de oldukça yüksek bir çeşittir.



Kızartmalık



Yemeklik



Fırında



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik ve parmak patates için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı ve pürüzsüz
Kuru Madde Oranı:	Orta derece

Yumru Özelliği:	Orta ve iri boy oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Uzun oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi
Çiçeklenme Aralığı:	Sık

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Y virüsüne karşı yüksek dayanıklılığına sahiptir.
Mantar Hastalıklarına Mukavemeti:	Yaprak yanıklığı ve rhizoctonia dayanımı oldukça yüksektir.


Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza oldukça yüksek dayanıklılığa sahiptir.
-------------------------------------	--

Dormansi Süreci

Orta geççi bir çeşit olan JELLY uzun dönem depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,
- Yemeklik için 28-30 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara dikkat edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,
- Dikimden önce gözlerin patlamış olması çıkışı hızlandırır,



Özellikleri:

- LAURA Kırmızı kabuk renginde orta geççi kaliteli depolama özelliğine sahip yemeklik aynı zamanda sanayilik olarak da kullanılabilecek oldukça lezzetli bir ürün çeşididir.
- LAURA tüm iklim tiplerine mükemmel derecede uyum sağlar.



Kızartmalık



Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli parmak patates ve yemeklik için uygundur.	Yumru Özelliği:	Orta ve iri boy oval yumrular
Yumru Et Rengi:	Sarı	Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Kabuk Rengi:	Kırmızı ve pürüzsüz	Yumru Boyutu:	İri ve uniform yumrular
Kuru Madde Oranı:	Orta derece	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Oldukça sık	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Yaprak kıvrıcıklığı virüsüne dayanıklılığı yüksek, Y virüsüne karşı dayanıklılığı çok yüksektir.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Dormansi Süreci

Orta geççi bir çeşit olan LAURA yüksek depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Tohumluk patates üretmek için sıra arası 19-21 cm,
- Yemeklik için 28-30 cm olmalı,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Mekanik hasara karşı direnci yüksek,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Markies

Özellikleri:

- MARKIES pazarlanabilir yüksek verimli sarı kabuk renkli açık sarı et rengine sahip parmak patatese ve cipse uygun bir çeşittir.
- MARKIES düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
- MARKIES kuraklığa karşı direnci oldukça yüksektir.
- MARKIES kuru madde oranı yüksek ve tüm toprak yapılarında yetiştirme özelliğine sahiptir.
- MARKIES Yumrular uzun oval yumru sayısı ve verimi yüksektir.



Kızartmalık



Cipslik



2019
TESCİLLİ

Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli parmak patates için uygun bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Uzun oval yumrular
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı	Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Kabuk Rengi:	Krem	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksektir	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Geççi	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Yn-virüsü ve Yntn-virüsüne dayanımı oldukça yüksektir. Virüs A'ya ve Virüs X'e son derece dayanımı yüksektir. Tütün halka virüsüne (Spraing) dayanımı yüksektir.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Erwinia ve adi uyuza orta derecede hassastır.
Mantar Hastalıklarına Mukavemeti:	Mantar hastalığına karşı oldukça dayanıklıdır. Geç yanıklığa yumrular ve yeşil aksamın dayanıklılığı yüksektir. Tozlu uyuza orta seviyede dayanıklıdır. Alternaria mantar patojenine çok hassastır.		

Dormansi Süreci

MARKIES uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Rumba®

Özellikleri:

- RUMBA pazarlanabilir yüksek verimli hem sanayide, hemde yemeklikte kullanılan bir çeşittir.
- RUMBA düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
- RUMBA kuru madde oranı oldukça yüksek olup cipslik sanayide kullanılabilir.
- RUMBA kurak iklime uyum sağlar dayanıklıdır.



Cipslik



Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli sanayilik ve yemeklik için uygun bir çeşittir.	Yumru Özelliği:	Kısa boy oval yumrular
Yumru Et Rengi:	Açık sarı	Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı	Yumru Boyutu:	Oval
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksektir	Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi	Çiçek Rengi:	Beyaz
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede	Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	Patates Y virüsüne ve yaprak kıvrıcıklığı virüsüne karşı yüksek dayanıklıdır.	Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza orta derece dayanıklıdır.
Mantar Hastalıklarına Mukavemeti:	Yaprak yanıklığına yüksek dayanıklıdır.		

Dormansi Süreci

Orta geççi bir çeşit olan RUMBA uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,



Ottawa®

Özellikleri:

- OTTAWA pazarlanabilir yüksek verimli sanayide ve özelliklede parmak patates de kullanılan bir çeşittir.
- OTTAWA düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
- OTTAWA kuru madde oranı yüksektir. Parmak patates tüketimine ve paketlemeye uygun bir çeşittir.
- OTTAWA sarı kabuk açık sarı et renklidir. Yumrular uzun oval yumru sayısı ve verimi yüksektir.



Kızartmalık



Paketlemeye
Uygun



2019
TESCİLLİ

Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı:	Pazarlanabilir yüksek verimli parmak patates için uygun bir çeşittir.
Yumru Et Rengi:	Açık Sarı
Yumru Kabuk Rengi:	Sarı
Kuru Madde Oranı:	Oldukça yüksektir

Yumru Özelliği:	Uzun oval yumrular
Göz Derinliği:	Sığ
Yumru Boyutu:	Oval
Verimlilik:	Çok yüksek pazarlanabilir verim

Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi:	Orta geççi
Çiçeklenme Aralığı:	Orta derecede

Çiçek Rengi:	Beyaz
Yeşil Aksam Yoğunluğu:	Oldukça sık

Hastalıklara Duyarlılık

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:	PVY-virüsüne dayanımı son derece yüksektir. Tütün halka virüsüne(Spraing) dayanımı düşüktür. Altın Kist nematodu, RO1 ve RO4 ırkına dayanıklıdır.
Mantar Hastalıklarına Mukavemeti:	Geç yanıklığa(mildiyö) yumru ve yeşil aksam dayanımı yüksektir.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:	Adi uyuza dayanımı yüksektir.
-------------------------------------	-------------------------------

Dormansi Süreci

Orta geççi bir çeşit olan OTTAWA uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

Dikim Önerileri

- Sertifikalı tohum kullanılmalı,
- Tohumlar kesilmemeli,
- Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,
- Tohum ilaçlaması yapılmalı,
- Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

EN SIK GÖRÜLEN PATATES HASTALIKLARI

Bakteriyel Solgunluk (Kahverengi Çürüklük)

Ralstonia solanacearum

Belirtileri

Hastalık infekte olmuş bitkilerde solgunluklara neden olur ve sonuçta bitkiler özellikle sıcak ve kuru koşullarda ölebilir. Kahverengi çürüklük iletim demeti hastalığıdır ve infekte olmuş yumrulara ilk hastalık belirtileri iletim dokularının kahverengileşmesidir ve bunlar yumrulara halkalar şeklinde görülür. Yumrular kesildiğinde de bakteriyel bir akıntı görülebilir. Kesilen yumrular gövde de olduğu gibi sıkıldığında bakteriyel akıntı daha açık olarak görülmektedir. Ağır olarak infektelenmiş yumrulara bu akıntılar yumru gözlerinden ve stolon yaralarında da çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu akıntılar toprağa bulaşır ve yumruların topraklı görünmesine neden olur.

Mücadelesi

Kültürel Mücadele:

1. Sertifikalı ve hastalıktan arı yumruların kullanımı önerilmektedir.
2. Nemli koşullarda yumru hasatından kaçınılmalıdır.
3. Hasat sırasında yumruların ezilmesi ve yaralanmamasına dikkat edilmelidir.
4. Kullanılan alet ve ekipmanların temizliğine önem verilmelidir.
5. Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
6. Tarlada hastalık etmenine konukçuluk yapabileceği düşünülen yabancı otların temizlenmesi ve yok edilmesi önerilir.



Bakteriyel Gövde ve Meyve Çürüklüğü

Erwinia carotovora subsp.carotovora

Genel Tanımı

Bakteriyel yumru yumuşak çürümesi, tarladaki aşırı derece ıslak yetiştirme koşulları ve depolama yerindeki çok nemli koşullar ile ilgili akışkan yumuşak bir çürümedir. Bu bakteriler genelde toprakta ve yumruların üzerinde bulunmuşlardır. Sonraları, gövde çürüklüğüne neden olan organizmalarda (Erwinia chrysanthemi) bu etmene dahil olmuştur. Bu bakteriyel ise sistematik olarak bitkilerde oluşur ve bunun yanında gövde çürüklüğü hem depolamada hem de dikimden sonra belirgin bir şekilde bakteriyel yumuşak çürümenin ıslak formuna sebep olabilir. Bu iki akışkan bakteriyel gövde çürümelerinin ikisini de görsel olarak ayırmak oldukça zordur.

Belirtileri

Yeşil akşam zamanla sararır ve ilk başlarda bitkiler ölebilir. Gövde kaidesinde ezik hafif kahverengi ile mürekkep siyahı lekeler gelişir. Havai yumrular da gövde üzerinde oluşabilir. Yumru çürüklüğü çoğunlukla gövdede başlar ve siyah, yapışkan bir çürüklük şeklinde son bulur. Gövde yumuşak çürüklüğü; lezyonları açık kahverengiden belirsizliğe kadar değişmektedir. Gövde dokuları çok fazla ezilmiş ve içi boş olabilir ve sümüksü bir sıvı ile dolmuş olabilir. Genellikle bu hastalık geç yanıklık hastalığı tarafından ortaya çıkan gövde enfeksiyonları ile ilişkili olan sekonder bir enfeksiyondur. Yumruların yumuşak çürüklüğü; yumrular üzerinde lezyonlar küçük bir göz kadar küçük olabileceği gibi tüm yumruyu da kaplayabilir. Yumrulardaki çürüklük aşırı derecede yumuşak ve renk olarak belirsizdir. Yumuşak çürüklük etmenleri nispeten kötü koku salmalarına rağmen, sekonder organizmalar çoğunlukla iğrenç bir kokuya neden olurlar.

Mücadelesi

Kimyasal Mücadele:

Bulaşık tohum yataklarının sezon süresince Chloropicrin ile ilaçlama tavsiye edilir. Toprak ilaçlamasında metil bromide ve metham-sodium daha az etkilidir. Bakırlı ilaçlar bakteriyel etmenin diğer bitkilere yayılmasını engellemek için tavsiye edilir.

Halka Çürüklüğü

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus



Belirtileri

Yumrular infekteli olarak ya da dikimden önce bulaşık olursa, hastalık belirtileri sezon ortasına kadar çıkmamaktadır. Başlangıçta toprak üstü hastalık belirtileri solgunluk veya sararma ve alt yaprakların kıvrılması şeklindedir. Solgunluklar günün sıcak zamanlarında daha fazla görülmeye başlar, bazen bulutlu ya da nemli havalarda tekrar iyileşiyor gibi bir görünüm verebilir. Sararma yaprak kenarlarında görülür. İç damar beneklenmesi nekrozları takiben görülebilir. Hastalık belirtileri bitkinin gövdesi tamamen soluncaya ve ölünceye kadar gelişmesini devam ettirir. Bu hastalık belirtileri sıcaklıklar düşük olduğunda daha az belirgin olabilir. İnfekteli bitkilerde göze çarpan diğer bir belirti, infekteli iletim demetlerinde bakterinin varlığıdır. İnfekteli gövde kesilir ve sıkılırsa, sütsü beyaz bir bakteriyel akıntı (ooze) salınmaktadır. Diğer bir belirti ise sezon ortası gelişmenin dışında hastalıklı bitkilerde cüceleşme ya da yeşil bir bodurluktur. İnfekteli bitkiler çalimsı ve rozet gelişimi gösterir ve bu bitkiler gelişme sezonlarında daha çarpıcı yaprak lekeleri meydana getirebilir. Toprak üstü hastalık belirtileri önemli, fakat hastalık ismini karakteristik yumru belirtilerinden almıştır. İnfekteli yumrulara iletim demeti halkaları parçalanır ve çürüme ilerlerken bu lekeler açık kremden koyu kahverengiye kadar değişen bir renk almaktadır.

Mücadelesi

Kültürel Mücadele:

1. Sertifikalı ve hastalıktan ari yumrular kullanılmalıdır.
2. Nemli koşullarda yumru hasatından kaçınılmalı, bulaşık tarladan elde edilen yumrular tohumlukta kullanılmamalıdır.
3. Hasat sırasında yumruların ezilmesi ve yaralanmamasına dikkat edilmelidir.
4. Kullanılan alet ve ekipmanların temizliğine önem verilmelidir.
5. 2-3 yıl gibi bir süre ürün rotasyonu tavsiye edilir.
6. Tarlada hastalık etmenine konukçuluk yapabileceği düşünülen yabancı otların temizlenmesi ve yok edilmesi tavsiye edilir.




Rhizoctonia Kanseri

Rhizoctonia solani

Belirtileri

Rhizoctonia hastalığının en tanıtıcı görülen belirtisi, patates yumruları üzerinde siyah bir derinin veya sklerotların varlığıdır. Bu sklerotlar büyüklük olarak çok küçük, düz ve yüzeysel siyah lekelerden büyük, kabartı ve düzensiz bir şekilde lekeler kadar değişmektedir ve bunlar yumrunun büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Ekstrem koşullarda, bu siyah deri patateslerin pazar değerini etkilerken, tohumluk olarak ayrılan patateslerde ise yeni inokulum kaynağı olduğundan belki de daha fazla önem arz etmektedir. Gövde ve stolonlar üzerinde karakteristik olan belirtiler kahverengi ile siyah renkli ve çökük haldedir. Bu tür kanser hastalığı, genişlemeye devam eder gövde ve stolonların etrafını sararak onların ölümlerine neden olabilir. Böyle bitkiler genellikle sağlığına hızla geri kavuşmakta, fakat hastalık bitkiyi zayıf düşürdüğünden erken yanıklık gibi diğer hastalıklara karşı hassaslaşırlar. Gelişen sekonder sürgünler ise daha az canlıdır ve çok daha fazla düzensiz gelişmelere neden olurlar. Ölmeyen, fakat şiddetli olarak etkilenmiş bitkilerin sürgünleri genellikle bodur kalırlar ve gelişme sezonu boyunca böyle kalmaya devam eder. Erken gelişme sezonlarında ortaya çıkan stolon enfeksiyonu yumru oluşumunun azalması ile sonuçlanır. Orta sezonlarda ortaya çıkan enfeksiyonlarda ise ana gövde üzerinde derin ve çökük leke kanserleri oluşur. Toprak üstü aksamlar da morlu bir sararma ve yukarı doğru kıvrılmalar görülebilir. Bu belirtiler bazı virüs hastalıklarının semptomları ile karışabilir. Rhizoctonia'yı diğerlerinden ayırmanın anahtarı havai yumruların oluşumu ve toprak altındaki gövdenin üzerinde kahverengi çökük lekelerin varlığıdır.



Rhizoctonia Kanseri

Rhizoctonia solani

Mücadelesi

Kültürel Mücadele:

1. Hastalık ile bulaşık, özellikle çoğalmada kullanılan yumru ve tohumların hastalıktan ari olmasına dikkat edilmelidir.
2. Hastalığın bulunduğu alanlarda toprak drenajına önem verilmeli ve tarlada su birikmesine müsaade edilmemelidir.
3. Bitkiler sık dikilmeden kaçınılmalı ve havalanma iyi olacak şekilde dikimler yapılmalıdır.
4. Kompost ve organik gübremeler dikkatli yapılmalı, yoksa hastalık daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkabilir.
5. Hastalıklı bitki artıkları inokulum kaynağı olduğundan yetiştirme ortamlarından uzaklaştırılmalı veya imha edilmelidir.
6. Hastalık etmenine alternatif konukçu (yulaf ve arpa gibi) bitkiler kullanılarak 2-3 yıl ürün rotasyonu yapılabilir.
7. Hastalık etmeni kumlu topraklarda azalma gösterirken, organik ve ağır topraklarda daha fazla ortaya çıkar, bundan dolayı üretim alanlarının toprak yapısına dikkat edilmelidir.
8. Bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır.
9. Bitkilerin ve yumruların dikimi, daha sıcak ve nemin az olduğu havalara kaydırılabilir.
10. Hastalık etmeni şekerpancarı ve yonca gibi bitkilerin ekimini takiben yapılan patates yetiştiriciliği hastalıktan daha fazla etkilenebilir.
11. Patates yumrularından bitkilerin toprak yüzeyine hızla çıkmasını sağlayacak kültürel önlemler artırılmalıdır.

Patates Uyuzu

Streptomyces scabies

Belirtileri

Patates uyuz hastalığını hastalık belirtileri tamamen değişkendir ve farklılıklar birçok faktöre; konukçunun dayanıklılığına, patojenin ırkına, enfeksiyon zamanına ve çevre koşullarına bağlıdır. Belirtiler küçük ve yuvarlaktır ve bu tür lezyonlar birleşerek daha büyükçe biçimsiz lezyonlara neden olabilir. Böcek zararı ile birlikte bu lezyonlar bazen derin bir şekilde ortaya çıkabilir.

Mücadelesi

Kültürel Mücadele:

1. Uyuz hastalığını görüldüğü alanlarda, dayanıklı çeşitlerin kullanılması tavsiye edilir.
2. Patojenin tarlaya girişini engellemek için hastalıktan ari ve sertifikalı tohumluklar kullanılmalıdır.
3. Ürün rotasyonu ve turp, şekerpancarı, lahana, ıspanak, havuç gibi alternatif bitkilerin yetiştirilmemesi tavsiye edilir. Ürün rotasyonunda buğdaygiller, mısır ve yonca (kırmızı yoncalar hariç) kullanılabilir.
4. Amonyum sülfat gibi asitlik artırıcı gübreler kullanılarak toprak PH'sı düşürülmelidir. Kireç ve gübre gibi toprak alkaliliğini artırıcı uygulamalardan kaçınılmalıdır.
5. Yumrular oluşmaya başladığı 2. ve 6. haftalarda su stresinden kaçınılmalıdır.



Solgunluk Hastalığı

Verticillium spp. Etmenleri

Belirtileri

Bitkilerin yeşil aksamalarında sararma ve ölmeler olabilir. İlk hastalık belirtileri tek taraflı yaprak sararması ile karakterize edilir, daha sonra bitkilerde solgunluklar baş gösterir ve ölen bitkiler dik bir şekilde kalmaya devam ederler. Gövde kesildiğinde dokuları belirgin olarak görülür. Özellikle toprak hattının alt kısımlarında infekteli bitkilerde infekteli kararmış dokular görülür. Bu hastalık verimi önemli ölçüde azaltabilir.

Mücadelesi

Kültürel Mücadele:

1. Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli ve hastalıktan ari ve sertifikalı yumrular kullanılmalıdır.
2. Toprak inokulum kaynağı olduğu için, toprak işleme işlerine büyük ölçüde dikkat edilmelidir.
3. Toprak ıslısının ani düşüşlerini engellemek için, sık sulama yapılmalıdır.
4. Bulaşık alanlarda hasta bitkiler sökülerek yok edilmelidir.
5. Sıcak Bölgelerde solarizasyon etkili bir kontrol yöntemidir.
6. Ürün rotasyonu yapılabilir (yonca ya da buğdaygiller tercih edilebilir).
7. Nitrojen gübrelerinin en uygun seviyede kullanımı hastalık şiddetini azaltmaktadır.
8. Gelişme sezonunda sulamanın kontrollü yapılması hastalık şiddetini azaltabilir.
9. Dayanıklı çeşitlerin kullanımı tavsiye edilir.



Tozlu Uyuz

Spongospora subterranea

Belirtileri

Hastalık etmeni patates yumrularında kahverengimsi deri hastalıklarına (2-20 mm çapında) neden olur. Bu derimsi lekeler koyu renkli sporları içermekte ve yumrular oluşmaya başlayınca, epidermis dokusunun hemen altında yayılmakta ve sporlar epidermis dokusunu yırtarak dışarı çıkarlar. Şiddetli durumlarda yumrular şekilsiz oluşur ve düzensiz ikincil gelişmeler ile kaplanır.

Mücadelesi

Kültürel Mücadele:

1. Hastalıktan ari ve sertifikalı yumrular kullanılmalıdır.
2. Bulaşık topraklarda yetiştiricilikten mümkün mertebe kaçınılmalıdır.
3. Hastalıklı tarlada çalıştıktan sonra botlar ve diğer çalışma aletleri temizlenmelidir.
4. Sulamayı mümkün mertebe azaltılmalı, aşırı sulamalar hastalığın şiddetini artırabilir.
5. Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.
6. Hayvansal gübreler iyice işlendikten sonra kullanılmalıdır.
7. Drenajı iyi olan topraklar yetiştiricilikte kullanılmalıdır.



Mildiyö Hastalığı

Phytophthora infestans


Belirtileri

Suyla ıslanmış gibi lekeler yaprak ve gövdeler üzerinde görülür, hızla genişler ve kahverengiye veya siyaha döner. Nemli koşullar altında beyaz küflü bir yüzey ya da bir halka görünümü yaprak altında lezyonun kenarında görülebilir. Serin ve ıslak koşullarda yanıklık hızla ilerler ve birkaç gün içerisinde tüm bir alanı etkileyebilir. Enfekteli yumrulara ilk önce kahverengi ile mor bir renklenme görülür, daha sonra ise kahverengimsi bir kuru çürüklük ya da ıslak çürüklük vardır. Yumrulara yanıklık enfeksiyonları çoğunlukla depolamanın ilk birkaç ayı içerisinde görülebilir, ama belirtiler depolama süresince de görülmeye devam edebilir.

Mücadelesi

Kültürel Mücadele:

1. Bahar dikimlerinden önce depolardan ve tarladan çürümüş ya da ezilmiş yumruların temizlenmesi önerilir. Tarlada kalan bitki artıklarının, toprağa gömülmesi ya da hayvanlara yedirilmesi tavsiye edilir.
2. Sertifikalı, hastalıktan ari yumruların kullanımı önerilir. Tohumluk yumrularının yetiştirildiği yerlerde hastalık etmeni görülüyorsa buralardan tohumluk yumru satın alınmamalıdır.
3. Yabancı otlar ve diğer bitkiler ile mücadele edilmelidir.
4. Hastalığın yayılmasını azaltacak uygun bir sulama sistemi uygulanmalıdır. Nemli ve bulutlu havalarda aşırı sulamalardan kaçınılması önerilir.
5. Toprak aşırı şekilde nemli ise hasattan kaçınılması önerilir.
6. Uygun havalandırması olan depolarda tohumluk yumrular depolanmalı ve yumrular üzerinde serbest su oluşumundan kaçınılmalıdır.
7. Mümkün mertebe dayanıklılık gösteren bitkiler tercih edilmelidir.





Toprađa bereketinizi ekiyoruz...

AR TARIM TOHUMCULUK SAN. ve TİC. A.Ş

Barboros Mh., Oymak Cd., No: 10, Sümer Hukuk Plaza, B Blok, Kat: 8 38040 Kocasinan - Kayseri / TURKEY

+90 (0) 352 330 30 32 / +90 (0) 352 336 30 32

artarim@artarim.com / info@artarim.com

